

**Національний
медичний університет**



**National University
of Medicine**

**Кафедра травматології
та ортопедії**

**Department of Traumatology
and Orthopedics**

252601ГСП, м. Київ, вул. Воровського, 27

27, Vorovskiy St., Kyiv, 252601

Тел.: (044) 246-51-26

Tel.: (044) 246-51-26

Факс: (044) 227-54-60, 245-04-90

Fax: (044) 227-54-60, 245-04-90

Білет № 3

1. Діагностика та лікування дисплазії кульшового суглоба та вродженого звиху стегна у дітей до 1 року та після 1 року.
2. Переломи хребта. Класифікація, клініка, принципи діагностики.
3. Показання, види та етапи хірургічної обробки вогнепальної рани. Особливості ПХО при вогнепальних пораненнях. Правила накладання джгута для зупинки кровотечі.
4. Обстеження ортопедо-травматологічного хворого.

5. Ситуаційна задача.

У пацієнта М. 64 років, після ендопротезування кульшового суглобу на третю добу виникли наступні симптоми: раптове погіршення загального стану, різке падіння артеріального тиску, задуха, почуття тиску за грудиною, нестача повітря, крила носа приймають участь в диханні. Об'єктивно: обличчя бліде, наявність на блідій ціанотичній шкірі бузкового відтінку папул на щоках, бокових поверхнях живота, грудей. Аускультативно: вологі хрипи. Температура підвищена. Рентгенологічно: тяжистість і ущільнення по ходу бронхіального дерева.

Поставте та обґрунтуйте діагноз у даного пацієнта?

З якими патологічними процесами необхідно проводити диференціальну діагностику?

Обґрунтуйте тактику лікування враховуючи діагноз та вік пацієнта.

6. Рентгенограма:

